

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ALBENDAZOLE/ PROVET δισκία 600
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET Α.Ε.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ALBENDAZOLE/ PROVET δισκία 600

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικό συστατικό: 600 mg Albendazole

Έκδοχα: Lactose, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Talc, Magnesium stearate, Silica colloidal anhydrous, Povidone, Indigotin (Indigo carmine) E 132, CI 73015, Tartrazine E 102, CI 19140, Ethanol, Hydrogenated castor oil

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Η αλβενδαζόλη συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γαστρεντερικής και πνευμονικής νηματώδωσης, της ταινίασης και της χρόνιας ηπατικής διστομίας των μόσχων, των προβάτων και των αγών.

Η αλβενδαζόλη είναι ανθελμινθικό με πολύ ευρύ φάσμα, αποτελεσματικό κατά των ενήλικων και των προνυμφικών μορφών πλήθους γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και ορισμένων μεγάλης οικονομικής σημασίας πλατυελμίνθων (κεστώδη και τρηματώδη). Επιπλέον, η αλβενδαζόλη παρουσιάζει και ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών νηματωδών και εκείνων της *Fasciola hepatica*. Ειδικότερα, η αλβενδαζόλη είναι αποτελεσματική κατά των παρακάτω παρασίτων:

ΝΗΜΑΤΩΔΗ

Haemonchus spp.

Ostertagia spp.

Trichostrongylus spp.

Cooperia spp.

Nematodirus spp.

Gaygeria pachyschelis

Marshallagia marshalli

Oesophagostomum spp.

Chabertia ovina

Dictyocaulus filaria

Protostrongylus rufescens

Muellerius capillaris

ΚΕΣΤΩΔΗ

Moniezia expansa

Avitellina spp.

ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ

Fasciola hepatica

Fasciola gigantica

Fascioloides magna

Dicrocoelium dendriticum

Η αλβενδαζόλη έχει παρασιτοκτόνες ιδιότητες και κατά των προνυμφικών μορφών των κεστωδών παρασίτων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Συνιστάται να μη χορηγείται σε νεαρά θηλυκά ερίφια που προορίζονται για αναπαραγωγή.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι, Πρόβατα, Αίγες

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται από το στόμα.

Η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με το είδος του παρασίτου και με το είδος του ζώου.

Πρόβατα-Αίγες

- 3,8 mg/ kg σ.β. (½ δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 600 ανά ζώο έως 80 kg σ.β.) κατά της γαστρεντερικής νηματώδωσης.

- 7,5 mg/ kg σ.β. (½ δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 600 ανά ζώο έως 40 kg σ.β.) κατά της πνευμονικής νηματώδωσης.

- 10 mg/ kg σ.β. (1 δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 600 ανά ζώο έως 60 kg σ.β.) κατά της ηπατικής διστομιάσης που οφείλεται στη *Fasciola hepatica*.

- 15 mg/ kg σ.β. (1 δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 600 ανά ζώο έως 40 kg σ.β.) κατά της ηπατικής διστομιάσης που οφείλεται στο *Dicrocoelium dendriticum*.

Μόσχοι

- 7,5 mg/ kg σ.β. (1 δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 600/ 80 kg σ.β.) κατά της γαστρεντερικής νηματώδωσης, της πνευμονικής νηματώδωσης, καθώς και κατά της ταινίασης.

- 10 mg/ kg σ.β. (1 δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 600/ 60 kg σ.β.) κατά της χρόνιας ηπατικής διστομιάσης που οφείλεται στη *Fasciola hepatica*. Στις πολύ έντονες μολύνσεις ή σε σοβαρές επιζωοτιολογικές καταστάσεις συνιστάται η δόση των 15 mg/ kg σ.β.

Τα δισκία χορηγούνται από το στόμα με το χέρι ή με εκτοξευτή.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μόσχοι: Κρέας & εδάδιμοι ιστοί: 6 ημέρες

Πρόβατα-Αίγες: Κρέας & εδάδιμοι ιστοί: 10 ημέρες

Γάλα: 5,5 ημέρες

Να μη χορηγείται σε αγελάδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να μη χορηγείται σε έγκυα ζώα στο πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης τους.

Να μη χορηγούνται δόσεις υψηλότερες των 15 mg/ kg σ.β. στις μοσχίδες και 10 mg/ kg σ.β. στα πρόβατα και τις αίγες, εφόσον πρόκειται για ζώα που βρίσκονται στο δεύτερο ήμισυ της εγκυμοσύνης τους.

Να μη χορηγείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην αλβενδαζόλη.

Η αλβενδαζόλη στερείται οποιασδήποτε δυσμενούς δράσης πάνω στη γονιμότητα των αρσενικών ζώων.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με 20 ή 50 δισκία σε συσκευασία blister

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 45705/08-07-2008/Κ-0034102

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777