

## ANERO

Πολυδύναμο εμβόλιο για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων των προβάτων.

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Το εμβόλιο ANERO περιέχει:

- Ανατοξίνη α του *Clostridium perfringens* τύπος A..... 2 IU/ml
- Ανατοξίνη β του *Clostridium perfringens* τύπος C..... 10 IU/ml
- Ανατοξίνη ε του *Clostridium perfringens* τύπος D..... 5 IU/ml
- Διάλυμα φορμαλδεύδης (HCHO).....έως..... 0,05%
- Υδροξείδιο του αργιλίου (Al(OH)<sub>3</sub>)..... 0,6-0,8%

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων:

- Εντεροτοξιναιμία προβάτων.
- Νόσος πολτώδους νεφρού.
- Δυσεντερία αμνών.
- Αιμορραγική εντερίτιδα αμνών.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν εμβολιάζονται ασθενή και παρασιτούμενα ζώα. Εμβολιάζονται ζώα με καλή υγεία και θρέψη.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το εμβόλιο ANERO είναι καλά ανεκτό απο τα ζώα που εμβολιάζονται. Μια ελαφρά, παροδική αντίδραση στο σημείο της ένεσης (υποδόριο οίδημα) μπορεί να παρατηρηθεί και είναι φυσιολογική.

### ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορηγείται 1 ml του εμβολίου υποδόρια. Επανάληψη μετά 6 εβδομάδες και κάθε χρόνο. Στα αρνιά συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να γίνεται στην ηλικία των 3 εβδομάδων. Στις προβατίνες που κυοφορούν συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να μη γίνεται αργότερα απο το 2,5 μήνα της κύησης και η επανάληψη μετά 6 εβδομάδες, αλλά όχι αργότερα απο τον 4 μήνα της κύησης.

### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν υπάρχει.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΦΥΛΑΞΗ

Το ANERO παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο θερμοκρασίας 4° - 8° C.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ  
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΩΡΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ