

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TERRAMYCIN/W/POLYMYXIN

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΚΑΙ ΆΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)

Κάθε gr του προϊόντος περιέχει.

Δραστική (ές) ουσία (ες).

Oxytetracycline Hydrochloride	34.19 mg
Polymyxin B Sulfate	1.46 mg

Έκδοχα

Mineral Oil	96.32 mg
White Petrolatum	868.03 mg

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Δικαιούχος σήματος: Pfizer Inc, USA

Παρασκευαστής υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, 49^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Αυλώνα Αττικής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα,

Τηλ: 210 6785800

4. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Όλα τα είδη των ζώων.

5. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την πρόληψη και θεραπεία των μολύνσεων του δέρματος των ζώων και ειδικότερα εκδορών, κάθε φύσης τραυμάτων (τυχαίων ή χειρουργικών), εγκαυμάτων, εξελκώσεων, ραγάδων, μικροβιακής έξω ωτίτιδας και ποδοδερματίτιδας.

6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Μετά προσεκτικό καθαρισμό του δέρματος, τίθεται επαρκής αλοιφή κατ' ευθείαν επί της πασχούσης περιοχής και περί τα άκρα της εξελκώσεως. Η άνευ επιδέσεως εξέλκωση επουλώνεται συνήθως ταχύτερα της μετά επιδέσεως τοιαύτη.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οπωσδήποτε δια την προάσπιση των τραυμάτων από μύγες, σκώληκες κλπ, επιβάλλεται πολλές φορές η χρήση χαλαρού επιδέσμου. Γενικά παρατηρούνται τα καλά αποτελέσματα εκ της χορηγούμενης τοπικώς αλοιφής Terramycin /w/ Polymyxin εντός 36 έως 48 ωρών από της έναρξεως της θεραπείας.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αν δεν σημειωθεί βελτίωση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, συνιστάται η αναθεώρηση της διαγνώσεως και λήψη των εκάστοτε καταλλήλων μέτρων.

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμιά

10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σπανίως εμφανίζονται αλλεργικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής με Terramycin /0057/ Polymyxin Oint..Αν παρά ταύτα παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις ,συνιστάται η διακοπή της θεραπείας.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C προστατευμένο από το φως.

13. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Καμιά

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κενά ή μερικά χρησιμοποιημένα φιαλίδια να καίονται ή να απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό πριν την απόρριψή τους

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

6.ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν εφαρμόζεται

ΑΜΚ: 22033/3-9-1993