

DELVOSTERON

PROLIGESTONE 100 mg/ml



ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενέσιμο υδατικό εναιώρημα Proligestone 100 mg/ml.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DELVOSTERON είναι προϊόν παρατεταμένης δράσης, που η προγεστερονική του δράση οφείλεται στην Proligestone, ενός προγεσταγόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκύλους και σε γάτες, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ελαχιστοποιεί τους κινδύνους στο ενδομήτριο και στην ωθήκη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- A. Έλεγχος του οίστρου (αναβολή ή μόνιμη αναστολή) σε σκύλους και γάτες.
 B. Θεραπεία και πρόληψη της ψευδοκύησης. Θεραπεία διαταραχών γαλουχίας, μητρορραγία και δερματίτιδα που οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές σε σκύλους και γάτες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σπανίως είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αποχρωματισμός και απώλεια του τριχώματος στην περιοχή της ένεσης καθώς και ενδομητρίτιδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό η χορήγηση DELVOSTERON να προκαλέσει οριστική διακοπή του οίστρου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το DELVOSTERON επιδρά στις ικανότητες των λαγωνικών (σκύλων κυνοδρομιών).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

A. Έλεγχος του οίστρου

1. Ζώα στα οποία δεν έχει προηγουμένως εφαρμοσθεί αγωγή με προγεσταγόνα:
- 1η χορήγηση κατά τη διάρκεια του άνοιστρου ή κατά την αρχή της εμφάνισης συμπτωμάτων του προοίστρου
 - 2η χορήγηση 3 μήνες μετά την πρώτη ένεση
 - 3η χορήγηση 4 μήνες μετά τη δεύτερη ένεση
 - Στη συνέχεια χορηγήσεις κάθε 5 μήνες
2. Ζώα στα οποία έχει προηγουμένως εφαρμοσθεί αγωγή με προγεσταγόνα:
- Αν έχουν προηγηθεί 2 ή περισσότερες χορηγήσεις: συνεχίζονται οι χορηγήσεις κάθε 5 μήνες.
 - Αν έχει προηγηθεί μία χορήγηση, τότε γίνεται μία χορήγηση στους 3 μήνες, ακολουθεί μία άλλη 4 μήνες μετά από την προηγούμενη και τέλος επαναλαμβάνονται ενέσεις κάθε 5 μήνες.

Παρατήρηση: Αν διακοπεί η εφαρμογή του δοσολογικού σχήματος, εξαιτίας εμφάνισης οίστρου ή προοίστρου, τότε εφαρμόζεται το δοσολογικό σχήμα A.1.

Τα συμπτώματα του προοίστρου εξαφανίζονται μέσα σε λίγες μέρες μετά τη χορήγηση του DELVOSTERON, εφόσον αυτή γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Οι σκύλοι επανέρχονται στον κανονικό τους κύκλο 9 μήνες μετά την τελευταία χορήγηση.

Δοσολογία:

Σκύλοι

< 5 kg	1,0 - 1,5 ml
5 - 10 kg	1,5 - 2,5 ml
10 - 20 kg	2,5 - 3,5 ml
20 - 30 kg	3,5 - 4,5 ml
30 - 45 kg	4,5 - 5,5 ml
> 45 kg	6 ml

Γάτες

< 3 kg	1,0 ml
3 - 5 kg	1,0 - 1,5 ml
> 5 kg	1,5 - 2,5 ml

Χορήγηση: υποδόρια

B. Άλλες ενδείξεις

Θεραπεία και πρόληψη ψευδοκύησης, θεραπεία διαταραχών γαλουχίας, μητρορραγία και δερματίτιδα που οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές σε σκύλους και γάτες:

Χορηγείται μία ή δύο φορές η παραπάνω προτεινόμενη δοσολογία και μετά από ένα μήνα επαναλαμβάνεται μία δόση.

Ακολουθώς η αγωγή βασίζεται πλέον στα κλινικά αποτελέσματα.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σκύλοι και γάτες στους οποίους εφαρμόστηκε αγωγή κατά τη διάρκεια του προοίστρου είναι δυνατόν να παραμένουν γόνιμοι για μία εβδομάδα. Εξαιτίας των διαφορών στην ηλικία κατά την οποία εμφανίζεται ο προοίστρος, συνιστάται να ανασβάλλεται η αγωγή μέχρις ότου τα συμπτώματα του προοίστρου καταστούν έκδηλα. Αν εφαρμοσθεί αγωγή κατά τη διάρκεια των αρχικών ή των τελικών σταδίων της εγκυμοσύνης, τότε ο τοκετός επιπλέκεται εξαιτίας ανεπαρκούς χαλάρωσης του τραχήλου. Η υποδόρια χορήγηση γίνεται καλύτερα σε σημείο του τραχήλου όπου το δέρμα συνδέεται χαλαρά με τους υποκείμενους ιστούς. Μετά τη χορήγηση διενεργείται ελαφρά εντριβή στο σημείο τη έγχυσης. Στα ζώα που πρόκειται να λάβουν μέρος σε εκθέσεις, η έγχυση είναι καλύτερο να γίνεται στη βουβωνική χώρα. Ανακινήστε το φιαλίδιο καλά πριν τη χορήγηση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Δεν απαιτούνται.