

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

BAYCOX[®] oral solution 2,5% **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Germany

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **BAYCOX[®] oral solution 2,5%**

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Δραστικό συστατικό: 25 mg/ ml Toltrazuril

Έκδοχα: Triethanolamin, Macrogol 200

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη θεραπεία της κοκκιδίωσης που προκαλείται από διάφορα είδη κοκκιδίων της *Eimeria*:

Κρεοπαραγωγά ορνίθια: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix* και *E. tenella*

Ινδορνίθια: *E. adenoides* και *E. meleagrimitis*

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται στις ωοπαραγωγές όρνιθες.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ορνίθια κρεοπαραγωγής και ινδορνίθια

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται με το πόσιμο νερό.

Συνιστάται η θεραπεία με Baycox[®] 2,5% σε δύο συνεχόμενες ημέρες σε δόση:

α) 25 ppm τολτραζουρίλης (1 ml Baycox[®] 2,5% ανά λίτρο πόσιμου νερού) αν η θεραπεία είναι συνεχόμενη (24 ώρες το εικοσιτετράωρο) ή εναλλακτικά

β) 75 ppm τολτραζουρίλης (3 ml Baycox[®] 2,5% ανά λίτρο πόσιμου νερού) αν η θεραπεία περιορίζεται στις 8 ώρες την ημέρα.

Η συνολική δόση (βάσει της ηλικίας του πτηνού και τη διαχείριση της μονάδας) δε θα πρέπει να είναι λιγότερη από 7 mg/ kg σ.β./ ημέρα.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σε συγκεντρώσεις μικρότερες του 1 ml Baycox[®] 2,5% ανά λίτρο πόσιμου νερού, μπορεί να προκληθεί ίζημα. Συνιστάται να παρασκευάζεται καθημερινά φρέσκο διάλυμα νερού με Baycox[®] 2,5%.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων προσθετικών στο πόσιμο νερό.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: Ινδορνίθες: 16 ημέρες

Όρνιθες: 14 ημέρες

Να μη χορηγείται σε πτηνά τα αυγά των οποίων προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το φως.

Φυλάσσεται μακριά από τις ζωοτροφές και τα παιδιά.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 12 εβδομάδες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Το Baycox® 2,5% είναι αλκαλικό. Να πλένονται αμέσως τα μάτια και τα χέρια με νερό σε περίπτωση που έλθουν σε επαφή με το προϊόν. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά τη χρήση του προϊόντος.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας των 50 ml και 100 ml
Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας των 1000 ml
Κάνιστρο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας των 5 L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 25784/18-04-2006/Κ-0050701

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777