

SPECTAM SCOUR HALT® SPECTINOMYCIN

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Spectam Scour Halt περιέχει σπεκτινομυκίνη, αντιβιοτικό της ομάδας των αμινογλυκοσιδών, που δρα κυρίως έναντι των αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών. Έχει κυρίως βακτηριοστατική δράση παρά βακτηριοκτόνο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για τη θεραπεία της εντερίτιδας της οφειλόμενης σε E. Coli.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το Spectam Scour-Halt χορηγείται από το στόμα.

Χοιρίδια κάτω των 5 kg Σ.Β. : 1 ml (1 δόση) δυο φορές την ημέρα.

Χοιρίδια άνω των 5 kg Σ.Β. : 2 ml (2 δόσεις) δυο φορές την ημέρα.

Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί επί 3-5 ημέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Εάν δεν παρατηρηθεί βελτίωση της κατάστασης των χοιριδίων εντός 48 ωρών συνιστάται επανεξέταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Κάθε πίεση του εμβόλου της αντλίας διοχετεύει 1 ml διαλύματος που περιέχει 50 mg σπεκτινομυκίνη.

Η μορφή του πλαστικού φιαλιδίου με την οποία κυκλοφορεί στο εμπόριο το Spectam Scour Halt καθιστά τη χρήση του ευκολώτατη.

Εφαρμόζεται στο πλαστικό φιαλίδιο η ειδική αντλία χορήγησης.

Τοποθετείται το ελεύθερο άκρο της στο βάθος της στοματικής κοιλότητας του χοιριδίου και πιέζεται το πώμα της.

Μετά τη χρήση να αφαιρείται η αντλία για την αποφυγή συγκόλλησής της.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τα χοιρίδια να μη σφάζονται 21 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου.