

Buscopan® compositum



504 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή, χοίρους και σκύλους.
Butylscopolaminiumbromide, metamizole sodium.

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της αδείας κυκλοφορίας και του κατόχου της αδείας παραγωγής που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση παρτίδων στον ΕΟΧ, εφόσον είναι διαφορετικοί.

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim /Rhein
Γερμανία

Παραγωγός υπεύθυνος για την υπελευθέρωση των παρτίδων:

Labiana Life Sciences S.A.
Venus 26, Can Parellada Industrial
08228 Terrassa
Ισπανία

Όνομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος
Buscopan® compositum 504 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή, χοίρους και σκύλους

Σύνθεση σε δραστικά συστατικά και άλλες ουσίες:

Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμίνη (hyoscine butylbromide): 4 mg/ml Νατριούχος μεταμίζολη (Metamizole sodium): 500 mg/ml Φαινόλη: 5 mg/ml

Ενδειξη(εις):

Άλογα:

Το Buscopan® compositum ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του γαστρικού πόνου που σχετίζεται με τον κολικό των ιπποειδών. Το Buscopan® compositum, δεν καλύπτει τα συμπτώματα των περιπτώσεων κολικών που απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

Βοοειδή/ μόσχοι:

Το Buscopan® compositum ενδείκνυται ως επικουρική θεραπεία των διαρροιών των μόσχων. Ανακουφίζει από τον πόνο και εξομαλύνει τη λειτουργία του εντέρου. Έτσι, ενδείκνυται για τις διαταραχές της πέψης, την απόφραξη οισοφάγου, την ανακούφιση από τους πόνους μετά τον τοκετό και τον τυμπανισμό.

Χοίροι:

Το Buscopan® compositum ενδείκνυται για την συμπτωματική αντιμετώπιση του πόνου που παρατηρείται σε όλες τις

μορφές των κολικών και την επικουρική αντιμετώπιση των διαρροιών των χοίρων.

Σκύλοι:

Το Buscopan® compositum ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του πόνου από παθήσεις του πεπτικού, ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Στη γαστρεντερίτιδα, το Buscopan® compositum μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα αντιβιοτικό ή ανθελμινθικό, ανάλογα με την αιτιολογία της ασθένειας.

Αντενδείξεις:

Ιστορικό υπερευαίσθησίας στις πυραζολόνες, παθήσεις του μυελού των οστών, αιματολογικές ή γαστρεντερικές διαταραχές, ππατική ή νεφρική ανεπάρκεια, κύπση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Αντιδράσεις υπερευαίσθησίας, ακοκιωμάτωση, λευκοπενία, θρομβοκυτταροπενία, αιμολυτική αναιμία, ναυτία, εμετός, γαστρεντερική αιμορραγία, μιτικός τρόμος, πόνος στην περιοχή της ένεσης.

Στα άλογα, μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική αύξηση του καρδιακού ρυθμού λόγω της παρασμηθολυτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου σκοπολαμίνης (hyoscine butylbromide).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Είδη ζώων

Άλογα, βοοειδή, χοίροι και σκύλοι.

Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός(οι) κορήγησης

Άλογα:

Το Buscopan® compositum θα πρέπει να χορηγείται στη δόση των 0,2 mg βουτυλοβρωμιούχου σκοπολαμίνης (hyoscine butylbromide) και 25 mg μεταμίζολης/kg σωματικού βάρους, με εφάπαξ ενδοφλέβια ένεση. Αυτό, αντιστοιχεί σε 5 ml του ενέσιμου δισλύματος/100 kg σωματικού βάρους