

# Contralac

ΑΝΤΙΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ

## ΣΥΝΘΕΣΗ

Contralac® 5: Metergoline.....0,5 mg Έκδοχο q.s.....1 δισκίο  
Contralac® 20: Metergoline.....2 mg Έκδοχο q.s.....1 δισκίο

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Η μετεργολίνη είναι ένα παράγωγο της εργολίνης που έχει ισχυρή και ταχεία δράση κατά της προλακτίνης. Αυτή η αναστολή της εκκρίσεως της προλακτίνης (γαλακτογόνου ορμόνης), επιφέρει σε μερικές ημέρες ταχεία υποχώρηση των συμπτωμάτων της ψευδοκώησης, της ανεπιθύμητης γαλακτοπαραγωγής μετά τον τοκετό και επιφέρει αλλαγή της συμπεριφοράς, μείωση του όγκου των μαστών, και αναστολή της παραγωγής ορώδους υγρού ακόμη και γάλακτος από τους μαστούς. Διαφέρει από τα άλλα σκευάσματα σε ότι αφορά τη δράση κατά της προλακτίνης. Η μετεργολίνη στις συνιστώμενες δόσεις δεν έχει ντοπαμινεργική δράση, πράμα που μειώνει την εμφάνιση συμπτωμάτων εμετού.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Σκύλος – Γάτα: • Διακοπή ανεπιθύμητης γαλακτοπαραγωγής της ψευδοκώησης.  
• Διακοπή ανεπιθύμητης γαλακτοπαραγωγής μετά τον τοκετό.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Καμία

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Πιθανός εμετός στην αρχή της θεραπείας. Μέτρια διάρροια. Αλλαγή της συμπεριφοράς (διέγερση ή ταραχή).

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Από το στόμα στον σκύλο και τη γάτα.

Σκύλος: 0,2mg/Kg σ.β μετεργολίνης την ημέρα, καταμεμημένης σε δύο λήψεις.

Contralac® 5: 1 δισκίο πρωί και βράδυ για 5 κιλά σ.β.

Contralac® 20: 1 δισκίο πρωί και βράδυ για 20 κιλά σ.β.

Η συνηθισμένη διάρκεια της θεραπείας είναι 4 ημέρες. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν μετά το τέλος της θεραπείας, η αγωγή παρατείνεται κατά 4 ημέρες (8 ημέρες συνολικά).

Γάτα: 0,25mg/Kg σ.β μετεργολίνης την ημέρα καταμεμημένη σε δύο λήψεις.

1 δισκίο Contralac® 5 για 4 κιλά σ.β. πρωί και βράδυ.

Η συνηθισμένη διάρκεια της θεραπείας είναι 4 ημέρες. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν μετά το τέλος της θεραπείας, η αγωγή παρατείνεται κατά 4 ημέρες (8 ημέρες συνολικά).

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η ποσότητα που θα χορηγηθεί μπορεί να έχει το ακόλουθο σχήμα:

ΓΑΤΑ		Contralac® 5		
Βάρος των ζώων σε Kg		2	4	6
Δόση για χορήγηση	πρωί	●	●	●●
	βράδυ	●	●	●●
Συνολικός αριθμός δισκίων για θεραπεία	4 ημερών	4	8	12
	8 ημερών	8	16	24

ΣΚΥΛΟΣ		Contralac® 5	Contralac® 20			
Βάρος των ζώων σε Kg		5	10	15	20	40
Δόση για χορήγηση	πρωί	●	●	●	●	●●
	βράδυ	●	●	●	●	●●
Συνολικός αριθμός δισκίων για θεραπεία	4 ημερών	8	4	6	8	16
	8 ημερών	16	8	12	16	32

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι παρενέργειες που ενδεχομένως θα παρατηρηθούν, δεν απαιτούν γενικά διακοπή της θεραπείας, η οποία εναπόκειται στην απόφαση του κτηνιάτρου που θεραπεύει το ζώο. Εν τούτοις, εάν το ζώο παρουσιάζει αλλαγή της συμπεριφοράς που εκδηλώνεται με επιθετικότητα, είναι προτιμότερο η θεραπεία να διακόπτεται. Η μείωση του όγκου των μαστών, συχνά θεαματική, μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη διακοπή της θεραπείας. Τότε μπορεί να επέλθει υποτροπή. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η επανάληψη της θεραπείας.

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:** Διατηρείται σε δροσερό μέρος.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- **Contralac® 5:** Κουτί με 16 δισκία των 0,5 mg
- **Contralac® 20:** Κουτί με 8 δισκία των 2 mg, διαιρούμενα
- **Contralac® 20:** Κουτί με 16 δισκία των 2 mg, διαιρούμενα

## ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Αρ. Αδείας ΕΟΦ 25364/95/10-6-96

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Virbac SA

1ère Avenue-L.I.D.-2065 m 06516-Carros (France)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

**Virbac Hellas A.E**

23ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 14565, Άγιος Στέφανος

Τηλ. 210-6219520, Fax. 210-8140900

e-mail: info@virbac.gr www.virbac.gr