

# BRONIPRA 1

Ζωντανό εμβόλιο κατά της Λοιμώδους Βρογχίτιδας των ορνίθων

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΔΟΣΗ:

Ιός Λοιμώδους Βρογχίτιδας, στέλεχος H-120 με ελάχιστο τίτλο  $10^3$  EID<sub>50</sub> ανά δόση.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το εμβόλιο αυτό παρασκευάζεται με το πάρα πολύ εξασθενημένο στέλεχος H-120, του ιού της Λοιμώδους Βρογχίτιδας που έχει πολλαπλασιαστεί με εμβρυοφόρα αυγά SPF.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Πτηνά: Πρόληψη της Λοιμώδους Βρογχίτιδας. Πρώτος εμβολιασμός των πουλάδων.

## ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Να μην εμβολιάζονται ασθενή και εξασθενημένα πτηνά.

## ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ:

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Πτηνά: 1 δόση/πτηνό.

## ΧΟΡΗΓΗΣΗ:

Με σταγόνα στα μάτια ή στους ρώθωνες: Όταν το περιεχόμενο του φιαλιδίου αποκατασταθεί με τον διαλύτη (30ml) χορηγείται μια σταγόνα σε κάθε πτηνό στο μάτι ή στον ρώθωνα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σταγονόμετρο (0,03ml διαλύματος).

Χορήγηση από το στόμα: Αποκαταστήστε το λυοφιλοποιημένο δισκίο του εμβολίου με τον διαλύτη μέχρι το μισό του φιαλιδίου. Ανακινείστε και ρίξτε το περιεχόμενο σε φρέσκο πόσιμο νερό για κατανάλωση μέσα σε ½ με 1 ώρα το αργότερο.

Ηλικία πτηνών

1-3 εβδομάδες

4-9 εβδομάδες

10-16 εβδομάδες

Ποσότητα νερού ανά 1.000 πτηνά

5-10 λίτρα

12-23 λίτρα

27-37 λίτρα

Με ψεκασμό: Αποκαταστήστε το λυοφιλοποιημένο δισκίο σε 300ml διαλύτη για πτηνά ηλικίας 1-15 ημερών και σε 500ml διαλύτη όταν τα πτηνά είναι 21 ημερών. (δόση 0,3-0,5ml διαλύματος).

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Ελαφρά αναπνευστικά συμπτώματα είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 5-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό ενήλικων πτηνών.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Το BRONIPRA 1 είναι ευαίσθητο σε απολυμαντικά, απορρυπαντικά, στην θερμοκρασία και στο φως του ήλιου. Γι' αυτό τον λόγο συνιστάται η μη έκθεση του εμβολίου στα παραπάνω.
- Εμβολιάζετε μόνο υγιή πτηνά.
- Ότι έχει απομείνει μετά από κάθε εμβολιασμό πρέπει να καταστρέφεται.
- Αποθηκεύεται στους 2-8 °C.



70629-01.0

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

09-16