

FATROXIMIN®

0,75 g/100 g

ενδομητριάσιος αφρός για αγελάδες και φορβάδες που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:
FATRO S.p.A
Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

FATROXIMIN 0,75 g/100 g ενδομητριάσιος αφρός για αγελάδες και φορβάδες που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Τα 100 g του προϊόντος περιέχουν: **Ενεργό συστατικό:** rifaximin 0,75 g.

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ο ενδομητριάσιος αφρός FATROXIMIN ενδείκνυται για τη πρόληψη και θεραπεία των μικροβιακών λοιμώξεων των γεννητικών οργάνων της αγελάδας και της φορβάδας και ειδικότερα κατά: της οξείας και χρόνιας ενδομητρίτιδας, μητρίτιδας, τραχηλίτιδας, αιδοιοκολπίτιδας και πυομήτρας.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Αγελάδες και φορβάδες που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο ενδομητριάσιος αφρός FATROXIMIN χορηγείται δια της κοιλικής ή ενδομήτριας οδού.

Συνιστώνται οι ακόλουθες δοσολογίες:

Αγελάδες

Οξεία και χρόνια ενδομητρίτιδα, μητρίτιδα, τραχηλίτιδα: 50 - 200 mg (ισοδυναμούν προς ½ - 2 φιάλες), ανάλογα με το μέγεθος της μήτρας, σε μία εφάπαξ χορήγηση.

Ο βαθμός διατάσεως του οργάνου κατά την χορήγηση ελέγχεται με ψηλάφηση από το απευθυσμένο.

Αιδοιοκολπίτιδα: 100 mg + 100 mg (ισοδυναμούν προς 1+1 φιάλη).

Επακολουθεί και δεύτερη έγχυση 24 ώρες μετά την πρώτη.


Πυομήτρα: 50 - 200 mg (ισοδυναμούν προς ½ - 2 φιάλες), ανάλογα με το μέγεθος της μήτρας και σε μία εφάπαξ χορήγηση.

Της εγχύσεως προηγείται απομάκρυνση του πύου από την κοιλότητα του οργάνου.


Φορβάδες

Οξεία και χρόνια ενδομητρίτιδα: 100 - 400 mg (ισοδυναμούν προς 1 - 4 φιάλες), ανάλογα με το μέγεθος της μήτρας και σε μία εφάπαξ χορήγηση.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ



Ενώστε το άκρο του καθετήρα με τη σύνδεση που υπάρχει στη συσκευασία



Συνδέστε το στη συνέχεια με το άκρο του υποδοχέα



Ανακινήστε καλά τη φιάλη



Τοποθετήστε τον υποδοχέα με τον καθετήρα στο άκρο της φιάλης



Εισάγετε τον καθετήρα στη μήτρα



Στρέψτε τη φιάλη σε κάθετη θέση



ΣΦΑΛΜΑ!
Μην κρατάτε τη φιάλη οριζόντια κατά την έγχυση του φαρμάκου

• Αγελάδες

- Εντοπίζεται ο τράχηλος κατά τη ψηλάφηση από το απευθυσμένο.

- Απολυμαίνονται τα χείλη του αιδοίου και εισάγεται ο καθετήρας.

- Συνδέεται ο καθετήρας με τη φιάλη η οποία κρατιέται κάθετα και σε ορθή γωνία με τον καθετήρα.

- Πιέζεται η βαλβίδα της φιάλης για ανάλογο προς τη δόση χρονικό διάστημα (βλ. Δοσολογικό σχήμα).

- Απομακρύνεται προσεκτικά ο καθετήρας.

• Φορβάδες

- Εντοπίζεται ο τράχηλος δια μέσου του κόλπου και σταθεροποιείται με το αριστερό χέρι.