

**CEVAC IBD L
BURSAL DISEASE VACCINE
ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ GUMBORO**

Το CEVAC IBD L είναι εμβόλιο ζωντανού ιού, λυόφιλο και χρησιμοποιείται για την ανοσοποίηση κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 7-14 ημερών κατά της νόσου Gumboro. Το εμβόλιο να χρησιμοποιείται σε μιλυσμένες εκτροφές και σε πτηνά που έχουν μητρικά αντισώματα. Διατηρείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 2-5° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ (ανά δόση εμβολίου)

Infectious Bursal disease virus, 2512 clone, G-61 strain: min 10^{2.0} EID₅₀

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

1. Μη χρησιμοποιείτε απολυμαντικά διαλύματα στο πόσιμο νερό 48 ώρες πριν και 24 ώρες μετά τον εμβολιασμό.
2. Σταματήστε τη χορήγηση νερού στα πτηνά 4-12 ώρες πριν τον εμβολιασμό, ώστε να διψάσουν. Η χρονική αυτή περίοδος ποικίλει ανάλογα με την ηλικία των πτηνών και τις κλιματολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος.
3. Τα σκεύη ποτίσματος να καθαρίζονται καλά πριν τον εμβολιασμό, χωρίς τη χρήση, όμως, απολυμαντικών.
4. Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου 1000 δόσεων με 10 kg καθαρό δροσερό πόσιμο νερό. Για τη σταθεροποίηση του εμβολίου συνιστάται η ανάμιξη 100 gr αποβούτυρωμένο γάλα σκόνη σε 45 kg νερό που χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό.
5. Μοιράστε το νερό με το εμβόλιο σε αρκετές ποτίστρες, ώστε κάθε πτηνό να έχει τη δυνατότητα να λάβει την ανάλογη ποσότητα νερού. Καλό είναι να προστίθενται και μερικές ποτίστρες επιπλέον.
6. Μη χορηγείτε άλλο νερό πριν καταναλωθεί αυτό που περιέχει το εμβόλιο. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε τη χορήγηση του κανονικού νερού.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σποραδικά δυνατό να εμφανιστεί κλινική ασθένεια και θάνατοι με τυπικές αλλοιώσεις της νόσου σε πτηνά που εμβολιάζονται με το εμβόλιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Χορηγήστε το πόσιμο νερό με το εμβόλιο αμέσως μετά την ανάμιξη όλο εφάπαξ χωρίς να υπερβαίνετε τις καθορισμένες δόσεις.
2. Μετά τον εμβολιασμό κάψτε τα άδεια φιαλίδια με τα τυχόν υπολείμματα του εμβολίου.
3. Να μη χορηγείται το εμβόλιο κατά της νόσου Gumboro σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια.
4. Εμβολιάζονται πάντοτε μόνο υγιή πτηνά.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Να μην εμβολιάζονται τα πτηνά 21 ημέρες πριν τη σφαγή.