

DIARSANYL®+ PREBIOTICS

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

Διαιτητικό προϊόν για σκύλους και γάτες σε μορφή πάστας

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ (g/100 ml)

Montmorillonite 40
Dextrose 25
Fructo-Oligosaccharides (FOS) 25
Glycerol 15

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σάκχαρα: 36,5%
Πρωτεΐνες: 0%
Ίνες: 0%
Λίπος: 0%
Τέφρα: 38%
Τέφρα αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ: 19%
Νερό: 22%
Νάτριο: 1,5% Μαγνήσιο: 0,3% Κάλιο: 0,3%
Χλωριούχο άλας: 3,5%
Ενέργεια: 6 MJ/kg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Συνιστάται η χορήγηση του Diarsanyl + κατά τη διάρκεια των περιόδων οξείας διάρροιας και ανάρρωσης από οξεία διάρροια.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορήγηση από το στόμα για 3 – 15 ημέρες.

Βάρος Ζώου	Δόση
2-7 kg	1 ml x 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ)
7-18 kg	2 ml x 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ)
18-30 kg	4 ml x 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ)
30-60 kg	10 ml x 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ)

Κάθε πίεση (βαθμολόγηση) του εμβόλου της δοσομετρικής σύριγγας των 10 ml αντιστοιχεί σε 1 ml.

Κάθε πίεση (βαθμολόγηση) του εμβόλου της δοσομετρικής σύριγγας των 24 ml αντιστοιχεί σε 2 ml.

Κάθε πίεση (βαθμολόγηση) του εμβόλου της δοσομετρικής σύριγγας των 60 ml αντιστοιχεί σε 10 ml.

Το άκρο της σύριγγας να εισάγεται στη γωνία του στόματος όσο γίνεται πιο πίσω στη γλώσσα.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ