

SELGIAN[®] 10 MG
ΔΙΣΚΙΑ Selegiline hydrochloride 10 mg

ΣΥΝΘΕΣΗ

- Selegiline hydrochloride..... 10 mg
(ή Selegiline base 8,37 mg)
- Έκδοχα.....έως.....510 mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θεραπεία των διαταραχών της συμπεριφοράς συναισθηματικής φύσεως στο σκύλο που απαντώνται ως άγχος, δυσθυμία, κατάθλιψη, διαταραχές κοινωνικής συμπεριφοράς, δυσκολία στην κοινωνική προσαρμογή, φοβίες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το υδροχλωρικό άλας σελεγιλίνης ως αναστολέας των μονοαμινοοξειδασών μπορεί να έχει επίδραση στην προλακτίνη. Λόγω απουσίας ειδικών μελετών συνιστάται να μη χορηγείται το SELGIAN[®] σε σκύλες που εγκυμονούν και γαλουχούν.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν αναφέρονται.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορηγούνται από το στόμα
0,5 mg Selegiline hydrochloride (ή 0,42 mg Selegiline) / kg Σ.Β. / 24 h εφάπαξ
(το πρωί, πριν τη χορήγηση τροφής).

Τα δισκία SELGIAN[®] 10 MG είναι εγχάραχτα και τεμαχίζονται στα 4.

<u>Βάρος σκύλου σε kg</u>	<u>Αριθμός δισκίων</u>
8 ≤ <12	1 / 2
12 ≤ <17	3 / 4
17 ≤ <22	1
22 ≤ <27	1 + 1 / 4
27 ≤ <32	1 + 1 / 2
32 ≤ <37	1 + 3 / 4
37 ≤ <42	2

Σε σκύλους βάρους έως 8 kg συνιστάται να δίνεται το SELGIAN[®] 4 MG.
Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται μέχρι τη σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας.

Η ελάχιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 2 μήνες, γνωρίζοντας απο τις κλινικές δοκιμές ότι:

- Για το 20% των σκύλων, η διάρκεια της θεραπείας είναι 2-3 μήνες.
- Για το 50% των σκύλων, η διάρκεια της θεραπείας είναι 4-5 μήνες.
- Για το 20% των σκύλων, η διάρκεια της θεραπείας είναι 6-7 μήνες.
- Για το 10% των σκύλων, η διάρκεια της θεραπείας είναι μεγαλύτερη των 7 μηνών.

Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται χωρίς προοδευτική ελάττωση των δόσεων.

* Εάν δεν παρατηρηθεί βελτίωση της κλινικής εικόνας σε διάστημα 2 μηνών, είναι ανώφελη η συνέχιση της θεραπείας.

* Σύμφωνα με τα τοξικολογικά δεδομένα, θεραπεία στη συνιστώμενη δοσολογία για 8 μήνες δεν έχει καμία αντένδειξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Δεν αναφέρονται.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 χρόνια.