

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

- 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**  
**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων**

**ORION PHARMA** Orion Corporation  
 Orionintie 1  
 FI-02200 Espoo, Finland

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

ANTISEDAN 5 mg/ml Ενέσιμο διάλυμα

**3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Κάθε 1 ml του προϊόντος περιέχει:

**Δραστική ουσία:**

Atipamezole hydrochloride 5mg

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Το Antisedan ενδείκνυται για την αναστροφή της πρέμησης και της αναλγησίας που επιτυγχάνεται με τη χρήση της μεντεομιδίνης ή της δεξμεντεομιδίνης στο σκύλο και στη γάτα, και για την αναστολή των άλλων ενεργειών της μεντεομιδίνης ή της δεξμεντεομιδίνης, όπως αυτές που προέρχονται από την επιδρασή του στο καρδιοαγγειακό και στο αναπνευστικό σύστημα.

**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυα ζώα. Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία επιδρούν στο ΚΝΣ, εκτός από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών.

**6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Στο σκύλο παρατηρείται παροδική υπόταση τα πρώτα 10 λεπτά μετά τη χορήγηση. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί έμετος, λαχάνιασμα, αφόδευση και τρομώδεις κινήσεις των μυών (πιθανό ρίγος).

Στις γάτες, όταν χρησιμοποιούνται χαμηλές δόσεις Antisedan για την μερική αναστολή της δράσης του Domitor, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν υποθερμίας (ακόμη και αν έχει αναστραφεί η ηρέμηση).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνιατρό σας.

**7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλος, γάτα

**8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Χορηγείται ενδομυικά.

**Σκύλοι:** Η καταλληλότερη δόση του Antisedan εκφραζόμενη σε μg/kg είναι πενταπλάσια της δόσης της μεντεομιδίνης που προηγήθηκε ή δέκα φορές της δόσης της δεξμεντεομιδίνης. Έτσι θα πρέπει να χορηγείται ίση ποσότητα Antisedan με την ποσότητα της μεντεομιδίνης ή δεξμεντεομιδίνης που προηγήθηκε.

Όταν η μεντεομιδίνη ή δεξμεντεομιδίνη χορηγηθεί με ή χωρίς βουτορφανόλη στην προαναισθητική αγωγή της γενικής αναισθησίας με θειοπεντόνη-αλοθάνιο στους σκύλους ή στην προαναισθητική αγωγή της αναισθητικής αγωγής, το Antisedan μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετεγχειρητικά για να αναστέλει την δράση του Domitor και να επιταχύνει την ανάνηψη.

Η χρήση του Antisedan μετεγχειρητικά επαναφέρει γρήγορα την πλήρη αισθητικότητα στο ζώο, μειώνοντας έτσι σημαντικά την περίοδο της πιθανής καταστολής του καρδιοαγγειακού συστήματος και της υποθερμίας.

Προτεινόμενη δοσολογία μετά τη χορήγηση μεντεομιδίνης στους σκύλους:

Χρήση μεντεομιδίνης	Προτεινόμενη δόση μεντεομιδίνης	Προτεινόμενη δόση Antisedan	
	μg/ kg	Ανά 10 kg	μg/ kg
Νάρκωση	10-80	0.1-0.8 ml	50-400
Προ-αναισθησία	10-20	0.1-0.2 ml	50-100
Με βουτορφανόλη	10-25	0.1-0.25 ml	50-125
Με βουτορφανόλη και θειοπεντόνη	10	0.1 ml	50
Με προποφόλη	10-40	0.1-0.4 ml	50-200
Με θειοπεντόνη	10-40	0.1-0.4 ml	50-200

Προτεινόμενη δοσολογία μετά τη χορήγηση δεξμεντεομιδίνης στους σκύλους:

Χρήση μεντεομιδίνης	Προτεινόμενη δόση μεντεομιδίνης	Προτεινόμενη δόση Antisedan	
	μg/ kg	Ανά 10 kg	μg/ kg
Νάρκωση	5-40	0.1-0.8 ml	50-400
Προ-αναισθησία	5-10	0.1-0.2 ml	50-100
Με βουτορφανόλη	5-12.5	0.1-0.25 ml	50-125
Με βουτορφανόλη και θειοπεντόνη	5	0.1 ml	50
Με προποφόλη	5-20	0.1-0.4 ml	50-200
Με θειοπεντόνη	5-20	0.1-0.4 ml	50-200