



# Finixin®

Ενέσιμο διάλυμα

## ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικά Συστατικά	% w/v
Flunixin (ως Flunixin Meglumine 8,50%) με περίσσεια 2,5% κατά την παραγωγή	5,00

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στα **ιπποειδή** ως αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό σε μυοσκελετικές παθήσεις και καλικούς. Επίσης, σε διάρροια πύλων, ενδοτοξική καταπληξία, κολίτιδα, αναπνευστική νόσος, πριν και μετά από οφθαλμική ή γενική χειρουργική επέμβαση, μετά από ιπποδρομία.

Στα **βοοειδή** σε οξεία αναπνευστική νόσος, οξεία κολιβακιλλική μαστίτιδα, ενδοτοξική καταπληξία, διάρροια μόσχων.

Στο **χοίρο** για το σύνδρομο MMA της συός.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό. Δεν πρέπει να χορηγείται στη γάτα, σε ζώα ηλικίας μικρότερης των 3 ημερών, με γαστρεντερικά έλκη, με αιματολογικές, ηπατικές ή νεφρικές διαταραχές.

Επίσης, η χορήγηση δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 5 ημέρες.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στα ιπποειδή μπορεί να παρατηρηθούν γαστρεντερικές διαταραχές, υποπρωτεϊναιμία ή και άλλες αιματολογικές διαταραχές. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί οίδημα, σκλήρυνση και δυσκαμψία στην περιοχή της ενδομυϊκής ένεσης, καθώς και εφίδρωση.

### ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με φάρμακα που έχουν υψηλή δεσμευτική ικανότητα με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Με φουροσεμίδη μείωση της διουρητικής δράσης της φουροσεμίδης. Με βαρφαρίνη, μεθотреζόλη, κορτικοστεροειδή, ακετυλοσαλικυλικό οξύ και άλλα ελκογενετικά φάρμακα. Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της αναισθησίας με μεθοξυφλουράνιο, ή πριν από την ανάνηψη από οποιαδήποτε μορφή αναισθησίας.

### ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**Ιπποειδή:** Ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως 1,1 mg/kg/18-24 ώρες για 5 ημέρες.

**Βοοειδή:** Ενδοφλεβίως 1,1-2,2 mg/kg/8-24 ώρες για 2-5 ημέρες.

**Χοίρος:** Ενδομυϊκώς 2 mg/kg/24 ώρες για 2-5 ημέρες.

### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή: Γάλα: 12 ώρες μετά την τελευταία χορήγηση.

Κρέας: 10 ημέρες.

Χοίρος: 18 ημέρες.

Ιπποειδή: 1 ημέρα.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό, σε θερμοκρασία όχι ανώτερη των 20° C.

Η διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη είναι 28 ημέρες.

Όπως όλα τα φάρμακα φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

### ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Υάλινα φιαλίδια των 50 ml, 100 ml και 250ml.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 1463/K-2349/1990

Α.Α.Κ. Κύπρου: CY00036V