

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

OXYVET® premix 10%
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλμιος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
OXYVET® premix 10%

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα 100 g προμίγματος περιέχουν:

Δραστικό συστατικό: 10 g Oxytetracycline HCl

Έκδοχα: Άλευρα σίτου

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Η οξυτετρακυκλίνη είναι αντιβιοτικό ευρέος φάσματος. Είναι δραστική έναντι θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών, ορισμένων μυκοπλασμάτων, χλαμυδίων, ρικετσιών και πρωτοζώων. Πιο συγκεκριμένα το OXYVET 10% πρόμικμα για φαρμακούχο ζωοτροφή συνιστάται σε:

Όρνιθες: για την πρόληψη και τη θεραπεία της μυκοπλάσμωσης (X.A.N.), κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας, χολέρας, τύφου, λοιμώδους κόρουζας, συνοβίτιδας, αρθροθλακίτιδας, εξαιμιάσης, δευτερογενών μολύνσεων που συνοδεύουν τη λοιμώδη βρογχίτιδα και λαρυγγοτραχειίτιδα.

Χοίροι: συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως ατροφική ρινίτιδα, πνευμονική παστεριδίαση, μυκοπλασματική πνευμονία (ενζωτική πνευμονία), πλευροπνευμονία (που οφείλεται στο *Haemophilus* spp.) και βρογχοπνευμονία των χοιριδίων (που οφείλεται στην *Bordetella bronchiseptica*). Επίσης, συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία των λοιμώξεων του πεπτικού συστήματος, όπως βακτηριδιακή εντερίτιδα, κολοβακτηριδίωση και σαλμονέλλωση των χοιριδίων.

Μινκ: για τη θεραπεία συστηματικών και τοπικών λοιμώξεων, όπως βακτηριδιακή διάρροια κ.α.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε ζώα με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.

Να μη χορηγείται σε φωτόκες όρνιθες.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι τετρακυκλίνες τείνουν να συμπλοκοποιούν τα ιόντα ασβεστίου (η δοξυκυκλίνη λιγότερο), και να εναποτίθενται - μη αναστρέψιμα - στα αναπτυσσόμενα οστά και στα έγκλειστα δόντια των νεαρών ζώων, ή ακόμα και του εμβρύου. Το φάρμακο που δεσμεύεται με αυτό τον τρόπο είναι φαρμακολογικά αδρανές.

Η χρήση των τετρακυκλινών σε ζώα που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη καθώς και σε ζώα που βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης των δοντιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό των δοντιών.

Η εντερική γλωρίδα μπορεί να επηρεαστεί, αν η θεραπεία παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικές διαταραχές.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Όρνιθες, Χοίροι, Μινκ

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το OXYVET 10% πρόμιγμα για φαρμακούχο ζωοτροφή χορηγείται από το στόμα αναμιγμένο με το φύραμα στην εξής δοσολογία ανά ημέρα:

Όρνιθες-Χοίροι-Μινκ: 30 mg οξυτετρακυκλίνης/kg σ.β. ή 0,3 g προϊόντος ανά kg σ.β. για 14 ημέρες

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.

Η χρήση των τετρακυκλινών σε ζώα που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη καθώς και σε ζώα που βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης των δοντιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό των δοντιών.

Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Σε περίπτωση πιθανής ή γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, η απευθείας επαφή ή εισπνοή πρέπει να αποφεύγονται. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες. Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Όρνιθια: (Κρέας και εδώδιμο ιστοί): 7 ημέρες

Να μη χορηγείται σε όρνιθες που παράγουν αβγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Χοίροι: (Κρέας και εδώδιμο ιστοί): 7 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25° C.

Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στην τροφή: 30 ημέρες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Οι τετρακυκλίνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά. Να μη χορηγούνται με υποκατάστατα γάλακτος. Η απορρόφησή τους από το έντερο μειώνεται με την παρουσία γάλακτος, αντιόξινων, καολίνης και παρασκευασμάτων σιδήρου.

Στα μονογαστρικά μπορεί να παρατηρηθεί ελάττωση της σύνθεσης και διάθεσης των βιταμινών του συμπλέγματος Β και Κ στο παχύ έντερο. Για λόγους προφύλαξης σε παρατεταμένης διάρκειας θεραπεία καλό είναι να χορηγούνται συμπληρώματα βιταμινών.

Μεγαλύτερη αναλογία από 1% ασβέστιο στο σιτηρέσιο μειώνει αισθητά τη δράση της οξυτετρακυκλίνης.

Να μην αναμιγνύονται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Γενικά, οι τετρακυκλίνες παρουσιάζουν ασυμβατότητα με πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, τυλοζίνη, γλωραμφαινικόλη και υδροκορτιζόνη.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκος των 5 kg και 25 kg

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 30525/15-04-2013/Κ-0005407

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777