ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

DEXAMEDIUM

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Intervet International BV,
Wim de Körverstraat 35,
NL-5831 AN Boxmeer,
Ολλανδία

Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
Intervet Hellas A.E., Αγ. Δημητρίου 63, 174 55 Άλιμος

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Dexamedium

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ανά ml:

Δραστικό συστατικό

Dexamethasone dimethylbutyrate	1,071 mg
ισοδύναμη προς dexamethasone	0,85 mg

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αντιφλεγμονώδης δράση, αντιαλλεργική δράση, αύξηση γλυκονεογένεσης (αντιμετώπιση της κέτωσης) και πρόκληση τοκετού (μηρυκαστικά).

Εξαιτίας της τετραήμερης διάρκειας δράσης του, το Dexamedium είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε φλεγμονώδεις καταστάσεις που απαιτούν μακρόχρονη διάρκεια δράσης καθώς και στην κέτωση στις αγελάδες.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι τυπικές αντενδείξεις των κορτικοστεροειδών: σακχαρώδης διαβήτης, οστεοπόρωση, υπεραδρενοκορτικοστεροειδισμός, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. Να μην χορηγείται σε ζώα με ιογενή, βακτηριακά και πρωτοζωικά νοσήματα (προκαλεί ανοσοκαταστολή), εκτός εάν χορηγούνται ταυτόχρονα κατάλληλα αντιμικροβιακά φάρμακα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Είναι γνωστό ότι τα κορτικοστεροειδή προκαλούν μεγάλο εύρος ανεπιθύμητων ενεργειών. Είναι δυνατόν να προκαλέσουν συμπτώματα του συνδρόμου Cushing που περιλαμβάνουν σημαντικές μεταβολές στον μεταβολισμό των λιπών, υδατανθράκων, πρωτεϊνών και μεταλλικών στοιχείων, με αποτέλεσμα την ανακατανομή του σωματικού λίπους, τη μυϊκή αδυναμία και απώλεια και την οστεοπόρωση. Έχουν αναφερθεί επίσης συμπτώματα πολυουρίας, πολυδιψίας και πολυφαγίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι αποτελεσματικές δόσεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν καταστολή του άξονα υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια.
Η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε αγελάδες κατά τη γαλουχία πιθανόν να προκαλέσει παροδική μείωση στην παραγωγή γάλακτος.
Η χορήγηση γλυκοκορτικοστεροειδών για την πρόκληση τοκετού, είναι δυνατόν να προκαλέσει ανωμαλίες στη διάπλαση του εμβρύου, να αυξήσει την πιθανότητα κατακράτησης του πλακούντα και να μειώσει τη βιωσιμότητα του νεογέννητου, Ωστόσο η αναπαραγωγική ικανότητα του επόμενου κύκλου δεν επηρεάζεται.
Τα κορτικοστεροειδή είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανοσοκαταστολή.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή, σκύλος, γάτα.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δοσολογία

Βοοειδή: 0,017 mg δεξαμεθαζόνης/kg σωματικού βάρους (2 ml Dexamedium/100 kg σωματικού βάρους)
Σκύλος, γάτα: 0.085 mg δεξαμεθαζόνης/kg σωματικού βάρους (0.1 ml Dexamedium/kg σωματικού βάρους)

Χορήγηση

Βοοειδή: χορήγηση με ενδομυϊκή ένεση.
Σκύλος, γάτα: χορήγηση με ενδομυϊκή ή υποδόρια ένεση.
Η ένεση πρέπει να διενεργείται τηρώντας τις συνήθεις συνθήκες ασηψίας.
Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί μετά από 4 ημέρες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της κέτωσης και την πρόκληση τοκετού, τα κορτικοστεροειδή βελτιώνουν αλλά δεν θεραπεύουν