

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### ORIDERMYL

1. **ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

VETOQUINOL  
MAGNY VERNOIS  
70200 LURE  
FRANCE (ΓΑΛΛΙΑ)

2. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

ORIDERMYL

3. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Permethrin.....1,0 g  
Neomycin sulphate.....350.000 IU  
Nystatin.....10.000.000 IU  
Triamcinolone acetonide.....0,10 g  
Έκδοχα έως.....100 g

4. **ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Ωτικές λοιμώξεις (έξω ωτίτιδα) λόγω βακτηρίων, ζυμομυκήτων και παράσιτων σε σκύλους.

5. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες.

6. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Καμία.

7. **ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλοι

8. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Ωτική χρήση.

Αφού καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του αυτιού, εισάγετε ποσότητα Oridermyl ίση με το μέγεθος ενός μπιζελιού και κάνετε απαλές μαλάξεις στη βάση του αυτιού. Καθαρίστε την περίσσεια προϊόντος από το περύγιο του αυτιού.

Εφαρμόστε τη θεραπεία μία φορά κάθε δεύτερη ημέρα μέχρι πλήρους ίασης. Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 21 ημέρες (διάρκεια κύκλου αναπαραγωγής του *Otodectes cynotis*).

9. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Καμία.

10. **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν εφαρμόζεται.

**11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

**12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

**i) Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα**

Η αλοιφή να μην εφαρμόζεται στο τρίχωμα, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία κατάποση όταν τα ζώα γλείφονται.

**ii) Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα**

Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χορήγηση του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος να αποφεύγουν την επαφή με αυτό.

**iii) Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου**

Η ασφάλεια του προϊόντος σε ζώα με ρήξη του τυμπανικού υμένα – μέση ωτίτιδα δεν είναι γνωστή.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Οκτώβριος 2008

**15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ**

CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15  
174 55 ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ. 210 9851200