

CARPRODYL[®] F 20 mg, δισκία για σκύλους
CARPRODYL[®] F 50 mg, δισκία για σκύλους
CARPRODYL[®] F 100 mg, δισκία για σκύλους

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ένα δισκίο περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

CARPRODYL[®] F 20 mg Carprofen.....20 mg

CARPRODYL[®] F 50 mg Carprofen.....50 mg

CARPRODYL[®] F 100 mg Carprofen.....100 mg

Εγχάραχτα κυκλικά δισκία, χρώματος μπλεζ.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου στις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και τις εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων.

Χρησιμοποιείται, ως συνέχεια της παρεντερικής αναλγησίας, στην αντιμετώπιση του πόνου μετεγχειρητικά.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται στις γάτες.

Να μη χορηγείται σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν ή γαλουχούν.

Να μη χορηγείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μη χορηγείται σε σκύλους με καρδιακή, ηπατική ή νεφρική νόσο, όπου υπάρχει πιθανότητα γαστρεντερικών ελκών ή αιμορραγίας, ή όπου υπάρχει ένδειξη δυσκρασιών του αίματος.

Να μη χορηγείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 4 μηνών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έχουν αναφερθεί οι χαρακτηριστικές ανεπιθύμητες ενέργειες των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα / διάρροια, υποκλινική παρουσία αίματος στα κόπρανα, ανορεξία και λήθαργος. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν κατά κανόνα την πρώτη εβδομάδα της θεραπείας και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι παροδικές, παρέρχονται με τη λήξη της θεραπείας και μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές ή θανατηφόρες.

Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε γαστρεντερική αιμορραγία.

Εάν συμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, να σταματήσει η χορήγηση του προϊόντος και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.

Όπως και με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα υπάρχει σπάνια ο κίνδυνος νεφρικών ή ιδιοσυκκρασικών ηπατικών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορήγηση από το στόμα.

4 mg καρπροφαίνη ανά kg σ.β. ανά ημέρα.

Για περιορισμό της φλεγμονής και ανακούφιση από τον πόνο στις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και τις εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων: Μια αρχική δόση 4 mg καρπροφαίνη ανά kg σ.β. ανά ημέρα, σε μία δόση ή δύο ίσες δόσεις. Η ημερήσια δόση μπορεί να ελαττωθεί, ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την κλινική ανταπόκριση. Θεραπεία μακράς διάρκειας πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από κτηνίατρο.

Για την επέκταση της αναλγητικής και αντιφλεγμονώδους δράσης μετεγχειρητικά, η προεγχειρητική χορήγηση ενέσιμης καρπροφαίνης να ακολουθείται από χορήγηση δισκίων καρπροφαίνης σε δόση 4 mg ανά kg σ.β. ανά ημέρα, για 5 ημέρες.

Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση.

Τα δισκία είναι εύγευστα και λαμβάνονται εκουσίως από τους περισσότερους σκύλους.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος. Τα δισκία και τμήματά τους να φυλάσσονται στην κυψέλη για προστασία από το φως.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Η χορήγηση σε υπερήλικες σκύλους μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χορήγηση σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά από κτηνίατρο οι σκύλοι.

Να αποφεύγεται η χορήγηση σε αφυδατωμένους, ολιγοογκαιμικούς, ή υποτασικούς σκύλους, καθώς υπάρχει δυνητικά αυξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητας.

Η ταυτόχρονη χορήγηση δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων πρέπει να αποφεύγεται.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν αναστολή της φαγοκυττάρωσης και έτσι κατά τη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων που συνδέονται με βακτηριακή λοίμωξη, να εφαρμόζεται ταυτόχρονα κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.

Να μη χορηγείται με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ταυτόχρονα ή σε διάστημα 24 ωρών. Μερικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα δυνατό να συνδέονται σε υψηλό βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος και ανταγωνίζονται άλλα φάρμακα με υψηλό βαθμό σύνδεσης επίσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τοξικά φαινόμενα.

Η ανταπόκριση σε μακράς διάρκειας θεραπεία να ελέγχεται από κτηνίατρο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης των δισκίων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως.

Πλύνετε τα χέρια μετά το χειρισμό του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία

Μελέτες σε ζώα εργαστηρίου (κουνέλι, αρουραίος) έδειξαν εμβρυοτοξικότητα της καρπιοφαίνης σε δόσεις πλησίον των θεραπευτικών.

Η ασφάλεια του προϊόντος σε θηλυκούς σκύλους που κυοφορούν και γαλουχούν δεν έχει διερευνηθεί. Να μη χορηγείται σε θηλυκούς σκύλους κατά την κύηση και γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η καρπιοφαίνη να μη χορηγείται με γλυκοκορτικοειδή.

Υπερδοσολογία

Δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα τοξικότητας σε σκύλους στους οποίους χορηγήθηκε καρπιοφαίνη σε δόσεις 6 mg/kg σ.β. δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες (τριπλάσια δόση της συνιστώμενης των 4 mg/kg σ.β.) και 6 mg/kg σ.β. μια φορά την ημέρα για περισσότερες των 7 ημερών (1,5 φορά η συνιστώμενη δόση των 4 mg/kg σ.β.).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την καρπιοφαίνη. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας να εφαρμόζεται η γενική υποστηρικτική θεραπεία η οποία χορηγείται στην υπερδοσολογία των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ενημερώστε τον κτηνίατρό σας αμέσως, εάν ο σκύλος σας λάβει μεγαλύτερη ποσότητα Carprodyl F από αυτή που συνταγογραφήθηκε.
Επειδή τα δισκία είναι εύγευστα, να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες δυνατό να συμβούν εάν καταποθεί μεγάλη ποσότητα δισκίων από το σκύλο. Εάν υπάρχει υποψία κατάποσης ποσότητας μεγαλύτερης από τη συνιστώμενη δόση, ενημερώστε τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα δισκία Carprodyl F είναι εύγευστα και λαμβάνονται από τους περισσότερους σκύλους εκουσίως.