

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

**ALBENDAZOLE/ PROVET δισκία 300 mg**  
**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**PROVET A.E.**

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**  
**ALBENDAZOLE/ PROVET δισκία 300 mg**

**3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Κάθε δισκίο περιέχει:

**Δραστικό συστατικό:** 300 mg Albendazole

**Έκδοχα:** Povidone K30, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Talc, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Hydrogenated castor oil, Tartrazine, Lactose, Alcohol, Purified water

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Η αλβενδαζόλη συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γαστρεντερικής και πνευμονικής νηματώδωσης, της ταινίασης και της χρόνιας ηπατικής διστομίας των μόσχων, των προβάτων, και των αιγών.

Η αλβενδαζόλη είναι ανθελμινθικό με πολύ ευρύ φάσμα, αποτελεσματικό κατά των ενήλικων και των προνυμφικών μορφών πλήθους γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και ορισμένων μεγάλης οικονομικής σημασίας πλατυελμίνθων (κεστώδη και τρηματώδη). Επιπλέον, η αλβενδαζόλη παρουσιάζει και ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών νηματωδών και εκείνων της *Fasciola hepatica*. Ειδικότερα, η αλβενδαζόλη είναι αποτελεσματική κατά των παρακάτω παρασίτων:

**ΝΗΜΑΤΩΔΗ**

*Haemonchus* spp.

*Ostertagia* spp.

*Trichostrongylus* spp.

*Cooperia* spp.

*Nematodirus* spp.

*Gaygeria pachyschelis*

*Marshallagia marshalli*

*Oesophagostomum* spp.

*Chabertia ovina*

*Dictyocaulus filaria*

*Protostrongylus rufescens*

*Muellerius capillaris*

**ΚΕΣΤΩΔΗ**

*Moniezia expansa*

*Avitellina* spp.

**ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ**

*Fasciola hepatica*

*Fasciola gigantica*

*Fascioloides magna*

*Dicrocoelium dendriticum*

Η αλβενδαζόλη έχει παρασιτοκτόνες ιδιότητες και κατά των προνυμφικών μορφών των κεστωδών παρασίτων.

## 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Συνιστάται να μη χορηγείται σε νεαρά θηλυκά ερίφια που προορίζονται για αναπαραγωγή.

## 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

## 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι, Πρόβατα, Αίγες

## 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται από το στόμα. Να χορηγείται σε νηστικά ζώα.

Η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με το είδος του παρασίτου και με το είδος του ζώου.

### Μόσχοι

- 7,5 mg/ kg σ.β. (2 δισκία ALBENDAZOLE δισκία 300/ 80 kg σ.β.) κατά της γαστρεντερικής νηματώδωσης, της πνευμονικής νηματώδωσης, καθώς και κατά της ταινίασης.

- 10 mg/ kg σ.β. (2 δισκία ALBENDAZOLE δισκία 300/ 60 kg σ.β.) κατά της χρόνιας ηπατικής διστομίας που οφείλεται στη *Fasciola hepatica*. Στις πολύ έντονες μολύνσεις ή σε σοβαρές επιζωοτιολογικές καταστάσεις συνιστάται η δόση των 15 mg/ kg σ.β.

Τα δισκία χορηγούνται από το στόμα με το χέρι ή με εκτοξευτή.

### Πρόβατα-Αίγες

- 3,8 mg/ kg σ.β. (½ δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 300 ανά ζώο έως 40 kg σ.β.) κατά της γαστρεντερικής νηματώδωσης.

- 7,5 mg/ kg σ.β. (1 δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 300 ανά ζώο έως 40 kg σ.β.) κατά της πνευμονικής νηματώδωσης.

-10 mg/ kg σ.β. (1+½ δισκίο ALBENDAZOLE δισκία 300 ανά ζώο έως 40 kg σ.β.) κατά της ηπατικής διστομίας που οφείλεται στη *Fasciola hepatica*.

- 15 mg/ kg σ.β. (2 δισκία ALBENDAZOLE δισκία 300 ανά ζώο έως 40 kg σ.β.) κατά της ηπατικής διστομίας που οφείλεται στο *Dicrocoelium dendriticum*.

## 9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία

## 10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μόσχοι: Κρέας & εδάδιμοι ιστοί: 6 ημέρες

Πρόβατα-Αίγες: Κρέας & εδάδιμοι ιστοί: 10 ημέρες

Γάλα: 5,5 ημέρες

Να μη χορηγείται σε αγελάδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

## 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

## 12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να μη χορηγείται σε έγκυα ζώα στο πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης τους.

Να μη χορηγούνται δόσεις υψηλότερες των 15 mg/ kg σ.β. στις μοσχίδες και 10 mg/ kg σ.β. στα πρόβατα και τις αίγες, εφόσον πρόκειται για ζώα που βρίσκονται στο δεύτερο ήμισυ της εγκυμοσύνης τους.

Να μη χορηγείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην αλβενδαζόλη.

Η αλβενδαζόλη στερείται οποιασδήποτε δυσμενούς δράσης πάνω στη γονιμότητα των αρσενικών ζώων.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Κουτί με 50 δισκία σε blister

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 37942/14-05-2013/Κ-0034109

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**\*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου\***  
**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ**  
**ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**