

Eprizero 5mg/ml διάλυμα

επίχυσης για μόσχους και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΩX, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Northern Ireland

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΕΣ) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1 ml του διαλύματος περιέχει:

Επρινομεκτίνη: 5 mg
Βουτυλιωμένο υδροξυτολουδίο (E321) 0.1mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδεικνυτά για τη θεραπεία και πρόληψη των ακόλουθων παρασίτων:

Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικες μορφές και προνύμφες 4ου σταδίου): *Ostertagia* spp., *Ostertagia lyrata* (ενήλικα), *Ostertagia ostertagi* (συμπεριλαμβανομένου του *O. ostertagi*), *Cooperia* spp. (συμπεριλαμβανομένου της *Cooperia* spp.), *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surinabada*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* spp., *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helveticus*, *Oesophagostomum* spp. (ενήλικα), *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris* spp. (ενήλικα).
Πνευμονικοί στρογγυλοί (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες 4ου σταδίου): *Dictyocaulus viviparus*

Υπόδερμα (παρασιτικό στάδιο): *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*
Ψώρες: *Chorioptes bovis*, *Sarcopetes scabiei* var *bovis*
Φθείρες: *Damalinia bovis* (biting lice), *Linognathus vituli* (sucking lice), *Haematopinus eurysternus* (sucking lice), *Solenopotes capillatus* (sucking lice).
Μύγες: *Haematobia irritans*.

Διάρκεια δράσης

Όταν το προϊόν εφαρμόζεται στην συνιστώμενη δόση, αποτέλει την επαναμόλυνση από τα παρακάτω παράσιτα:

Παράσιτα *	Διάρκεια δράσης
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	έως 28 ημέρες
<i>Ostertagia</i> spp.	έως 28 ημέρες
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	έως 28 ημέρες
<i>Cooperia</i> spp.	έως 21 ημέρες
<i>Trichostrongylus</i> spp	έως 21 ημέρες
<i>Haemonchus placei</i>	έως 14 ημέρες
<i>Nematodirus helveticus</i>	έως 14 ημέρες

Τά παρακάτω παράσιτα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε ξεχωριστό γένος: *Ostertagia ostertagi*, *O. lyrata*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata*, *C. surinabada*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το προϊόν προσφέρεται μόνο για τοπική εφαρμογή σε μόσχους και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και τις θηλάζουσες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Μην το χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων. Μην το χορηγείται από στόματος ή με ένεση. Μην το χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη δόση. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνιάτρο σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ, ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγήστε μόνο με τοπική εφαρμογή στη δόση του 1 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιστώμενης δόσης των 0,5 mg επρινομεκτίνης ανά kg σωματικού βάρους. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται τοπικά με την έκχυση κατά μήκος της ράχης σε μια στενή λωρίδα που εκτείνεται από το ακρών ως την βάση της ουράς. Εάν υπάρχει κίνδυνος επαναμόλυνσης η συμβουλή κτηνιάτρου θα πρέπει να ζητείται όσον αφορά την ανάγκη και τη συχνότητα της επαναλαμβάνομενης χορήγησης.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το προϊόν ως μέρος ενός προγράμματος για τον έλεγχο τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών παρασίτων των βοοειδών με βάση την επιδημιολογία αυτών των παρασίτων.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για να εξαφαλιστεί η χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ακρίβεια της συσκευής χορήγησης πρέπει να ελέγχεται.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της δοσομετρικής συσκευής, την προσαρμογή της δόσης, και φροντίδα του πιστολιού χορήγησης μετά τη χρήση.

Η βροχή σε οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά τη θεραπεία δεν θα επηρέασει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΗΣ

Κρέας & εντόσθια: 10 ημέρες

Γάλα: 0 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Μη φυλάσσετε πάνω από 30 °C. Διατηρείτε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Προστατέψτε τον από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επρινομεκτίνη είναι πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να συσσωρεύεται σε ιχημάτα.

Οπως και άλλες μακροκυκλικές λακτόνες, η επρινομεκτίνη έχει τη δυνατότητα να επηρέασει δυσμενώς οργανισμούς μη-στόχους.

Μετά την χορήγηση, η απέκκριση των δυνητικά τοξικών επίπεδων επρινομεκτίνης μπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες. Τα κόπρανα που περιέχουν επρινομεκτίνη

αποβάλλονται σε βοσκότοπους από τα υπόθυρα της ζώων και μπορεί να μειώσει και να υποβαθμίσει τον πληθυσμό των οργανισμών που διατρέφονται με κόπρανα.